Exercice 5 :

30% des individus dans le monde ont déjà été infectés dans leur vie par un virus du type Coronavirus.

Soit K l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

1°) Lorsque la taille n de l'échantillon augmente, que devient la largeur de l'intervalle ? Que devient alors la proportion d'échantillons dont la fréquence est dans K ?

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion d'échantillons dont la fréquence est dans K . Lorsque n est très grand, quelle est cette proportion ? Vers quoi se rapproche cette fréquence ?

Exercice 5 :

30% des individus dans le monde ont déjà été infectés dans leur vie par un virus du type Coronavirus.

Soit K l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

1°) Lorsque la taille n de l'échantillon augmente, que devient la largeur de l'intervalle ?

Exercice 5 :

30% des individus dans le monde ont déjà été infectés dans leur vie par un virus du type Coronavirus.

Soit K l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

1°) Lorsque la taille n de l'échantillon augmente, que devient la largeur de l'intervalle ?

$K = [f_1 ; f_2]$ $p = \text{probabilité} = 30\%$

$$\begin{aligned} \text{Largeur} &= f_2 - f_1 = \left(p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \left(p - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \\ &= p + \frac{1}{\sqrt{n}} - p + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Exercice 5 :

30% des individus dans le monde ont déjà été infectés dans leur vie par un virus du type Coronavirus.

Soit K l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

1°) Lorsque la taille n de l'échantillon augmente, que devient la largeur de l'intervalle ?

$K = [f_1 ; f_2]$ $p = \text{probabilité} = 30\%$

$$\begin{aligned} \text{Largeur} &= f_2 - f_1 = \left(p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \left(p - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \\ &= p + \frac{1}{\sqrt{n}} - p + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Lorsque n augmente, sa racine carrée augmente, et l'inverse diminue. Donc la **largeur** diminue.

Soit K l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$.

1°) $K = [f_1 ; f_2]$ $p = \text{probabilité} = 30\%$

$$\begin{aligned} \text{Largeur} = f_2 - f_1 &= \left(p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \left(p - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \\ &= p + \frac{1}{\sqrt{n}} - p + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Lorsque n augmente, sa racine carrée augmente, et l'inverse diminue. Donc la **largeur** diminue.

Exemple :

n	f_1	f_2	largeur
25	0,1	0,5	0,4
100	0,2	0,4	0,2
2500	0,28	0,32	0,04

Soit K l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$.

1°) Lorsque la taille n de l'échantillon augmente, que devient la largeur de l'intervalle ?

$K = [f_1 ; f_2]$ $p = \text{probabilité} = 30\%$

$$\begin{aligned} \text{Largeur} &= f_2 - f_1 = \left(p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \left(p - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \\ &= p + \frac{1}{\sqrt{n}} - p + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Lorsque n augmente, sa racine carrée augmente, et l'inverse diminue. Donc la **largeur** diminue.

Que devient alors la proportion d'échantillons dont la fréquence est dans K ?

Soit K l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$.

1°) Lorsque la taille n de l'échantillon augmente, que devient la largeur de l'intervalle ?

$K = [f_1 ; f_2]$ $p = \text{probabilité} = 30\%$

$$\begin{aligned} \text{Largeur} &= f_2 - f_1 = \left(p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \left(p - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \\ &= p + \frac{1}{\sqrt{n}} - p + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Lorsque n augmente, sa racine carrée augmente, et l'inverse diminue. Donc la **largeur** diminue.

Que devient alors la proportion d'échantillons dont la fréquence est dans K ?

La **largeur** diminue donc la **proportion** diminue aussi.

Soit K l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$.

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion d'échantillons dont la fréquence est dans K .

Lorsque n est très grand, quelle est cette proportion ?

Vers quoi se rapproche cette fréquence ?

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule **dans un tableur** le phénomène aléatoire.

Le fonctionnement d'un tableur n'est pas à connaître par cœur par un élève de 2^{nde}, les indications suivantes sont apportées pour informations.

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K .

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule **dans un tableur** le phénomène aléatoire
« *L'individu tiré au sort est-il infecté ?* » par un phénomène aléatoire : `= alea()`

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule dans un tableur le phénomène aléatoire
« *L'individu tiré au sort est-il infecté ?* » par un phénomène aléatoire : = alea()
de même probabilité : en G4 = si (alea() ≤ 0,3 ; 1 ; 0)

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule dans un tableur le phénomène aléatoire
« *L'individu tiré au sort est-il infecté ?* » par un phénomène aléatoire : = alea()

de même probabilité : en G4 = si (alea() ≤ 0,3 ; 1 ; 0)

que je reproduis n fois en dupliquant G4 jusqu'en G253

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule dans un tableur le phénomène aléatoire « *L'individu tiré au sort est-il infecté ?* » par un phénomène aléatoire : = alea()

de même probabilité : en G4 = si (alea() ≤ 0,3 ; 1 ; 0)

que je reproduis n fois en dupliquant G4 jusqu'en G253 puis en dupliquant 1 fois, 2 fois, etc... 250 fois en colonne selon la ligne 1, ligne 2 etc... ou ligne 250.

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule dans un tableur le phénomène aléatoire « *L'individu tiré au sort est-il infecté ?* » par un phénomène aléatoire : = alea()

de même probabilité : en G4 = si (alea() ≤ 0,3 ; 1 ; 0)

que je reproduis n fois en dupliquant G4 jusqu'en G253 puis en dupliquant 1 fois, 2 fois, etc... 250 fois en colonne selon la ligne 1, ligne 2 etc... ou ligne 250.

La fréquence f est : en D4 = somme (G4 : JN4) / A4

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule dans un tableur le phénomène aléatoire « *L'individu tiré au sort est-il infecté ?* » par un phénomène aléatoire : = alea()

de même probabilité : en G4 = si (alea() ≤ 0,3 ; 1 ; 0)

que je reproduis n fois en dupliquant G4 jusqu'en G253 puis en dupliquant 1 fois, 2 fois, etc... 250 fois en colonne selon la ligne 1, ligne 2 etc... ou ligne 250.

La fréquence f est : en D4 = somme (G4 : JN4) / A4

Chaque échantillon est dans K si j'obtiens 1 en E4

$$= \text{si} (f > f_1 ; 1 ; 0) * \text{si} (f < f_2 ; 1 ; 0)$$

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule dans un tableur le phénomène aléatoire « *L'individu tiré au sort est-il infecté ?* » par un phénomène aléatoire : = alea()

de même probabilité : en G4 = si (alea() ≤ 0,3 ; 1 ; 0)

que je reproduis n fois en dupliquant G4 jusqu'en G253 puis en dupliquant 1 fois, 2 fois, etc... 250 fois en colonne selon la ligne 1, ligne 2 etc... ou ligne 250.

La fréquence f est : en D4 = somme (G4 : JN4) / A4

Chaque échantillon est dans K si j'obtiens 1 en E4

$$= \text{si} (f > f_1 ; 1 ; 0) * \text{si} (f < f_2 ; 1 ; 0)$$

La proportion T est en F4 = somme (E\$4 : E4) / A4

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [f_1 ; f_2] \quad p = 30\%$$

Je simule dans un tableur le phénomène aléatoire « *L'individu tiré au sort est-il infecté ?* » par un phénomène aléatoire : = alea()

de même probabilité : en G4 = si (alea() ≤ 0,3 ; 1 ; 0)

que je reproduis n fois en dupliquant G4 jusqu'en G253 puis en dupliquant 1 fois, 2 fois, etc... 250 fois en colonne selon la ligne 1, ligne 2 etc... ou ligne 250.

La fréquence f est : en D4 = somme (G4 : JN4) / A4

Chaque échantillon est dans K si j'obtiens 1 en E4

$$= \text{si} (f > f_1 ; 1 ; 0) * \text{si} (f < f_2 ; 1 ; 0)$$

La proportion T est en F4 = somme (E\$4 : E4) / A4

puis en dupliquant f, le test, et T, jusqu'à la ligne 253.

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			T_{250}	0,956		taille n	1	2	3
2		$K = [f_1 ; f_2]$							
3	ech. n°	f_1	f_2	f	f dans K ?	T	simulations		
4	1	0	1	1	1	1,000	1		
5	2	0	1	0,5	1	1,000	0	1	
6	3	0	0,877	0	1	1,000	0	0	0
7	4	0	0,800	0	1	1,000	0	0	0
8	5	0	0,747	0,4	1	1,000	1	0	1
9	6	0	0,708	0,1666667	1	1,000	0	0	0
10	7	0	0,678	0,1428571	1	1,000	0	0	0
11	8	0	0,654	0,375	1	1,000	0	1	0
12	9	0	0,633	0,4444444	1	1,000	1	1	0
13	10	0	0,616	0,6	1	1,000	1	0	0
14	11	0	0,602	0,3636364	1	1,000	0	0	0
15	12	0,011	0,589	0,25	1	1,000	0	0	0
16	13	0,023	0,577	0,3846154	1	1,000	1	0	1

2°) Par une simulation informatique, déterminez, lorsque n augmente, l'évolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			T_{250}	0,956		taille n	1	2	3
2		$K = [f_1 ; f_2]$							
3	ech. n°	f_1	f_2	f	f dans K ?	T	simulations		
4	1	0	1	1	1	1,000	1		
5	2	0	1	0,5	1	1,000	0	1	
6	3	0	0,877	0	1	1,000	0	0	0
7	4	0	0,800	0	1	1,000	0	0	0
8	5	0	0,747	0,4	1	1,000	1	0	1
9	6	0	0,708	0,1666667	1	1,000	0	0	0
10	7	0	0,678	0,1428571	1	1,000	0	0	0
11	8	0	0,654	0,375	1	1,000	0	1	0
12	9	0	0,633	0,4444444	1	1,000	1	1	0
13	10	0	0,616	0,6	1	1,000	1	0	0
14	11	0	0,602	0,3636364	1	1,000	0	0	0
15	12	0,011	0,589	0,25	1	1,000	0	0	0
16	13	0,023	0,577	0,3846154	1	1,000	1	0	1

On sélectionne de F4 à F253, et on va dans Insertion → Graphiques → Nuage de points

2°) Evolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

On sélectionne de F4 à F253, et on va dans Insertion → Graphiques → Nuage de points.

2°) Evolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

Quelles caractéristiques sont sur les axes ?

2°) Evolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

Quelles caractéristiques sont sur les axes ?

2°) Evolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

Ouvrez le fichier 10 (tableur Excel) et appuyez plusieurs fois sur la touche F9 du clavier.

2°) Evolution de la proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K.

Ouvrez le fichier 10 (tableur Excel) et appuyez plusieurs fois sur la touche F9 du clavier.

2°) La proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K ...

Lorsque n est très grand, quelle est cette proportion ?

2°) La proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K se rapproche de $\approx 95\%$

L'intervalle K se rétrécit, mais il y a de plus en plus d'échantillons dont la fréquence est dans K.

2°) La proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K se rapproche de $\approx 95\%$

L'intervalle K se rétrécit, mais il y a de plus en plus d'échantillons dont la fréquence est dans K.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			T_{250}	0,968		taille n	1	2
2		$K = [f_1; f_2]$						
3	ech. n°	f_1	f_2	f	f dans K ?	T	simulations	
4	1	0	1	1	1	1,000	1	
5	2	0	1	0	1	1,000	0	0
6	3	0	0,877	1	0	0,667	1	1
7	4	0	0,800	0,25	1	0,750	0	0
8	5	0	0,747	0,2	1	0,800	1	0
9	6	0	0,708	0,5	1	0,833	0	1
10	7	0	0,678	0,1428571	1	0,857	1	0
11	8	0	0,654	0,25	1	0,875	1	0
12	9	0	0,633	0,5555556	1	0,889	1	1
13	10	0	0,616	0,2	1	0,900	0	0
14	11	0	0,602	0,1818182	1	0,909	1	0
15	12	0,011	0,589	0,25	1	0,917	1	0
16	13	0,023	0,577	0,4615385	1	0,923	0	1
17	14	0,033	0,567	0,2142857	1	0,929	1	0
18	15	0,042	0,558	0,4666667	1	0,933	0	0

2°) La proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K se rapproche de $\approx 95\%$

L'intervalle K se rétrécit, mais il y a de plus en plus d'échantillons dont la fréquence est dans K.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			T_{250}	0,968		taille n	1	2
2		$K = [f_1; f_2]$						
3	ech. n°	f_1	f_2	f	f dans K ?	T	simulations	
4	1	0	1	1	1	1,000	1	
5	2	0	1	0	1	1,000	0	0
6	3	0	0,877	1	0	0,667	1	1
7	4	0	0,800	0,25	1	0,750	0	0
8	5	0	0,747	0,2	1	0,800	1	0
9	6	0	0,708	0,5	1	0,833	0	1
10	7	0	0,678	0,1428571	1	0,857	1	0
11	8	0	0,654	0,25	1	0,875	1	0
12	9	0	0,633	0,5555556	1	0,889	1	1
13	10	0	0,616	0,2	1	0,900	0	0
14	11	0	0,602	0,1818182	1	0,909	1	0
15	12	0,011	0,589	0,25	1	0,917	1	0
16	13	0,023	0,577	0,4615385	1	0,923	0	1
17	14	0,033	0,567	0,2142857	1	0,929	1	0
18	15	0,042	0,558	0,4666667	1	0,933	0	0

2°) La proportion T d'échantillons dont la fréquence est dans K se rapproche de $\approx 95\%$

L'intervalle K se rétrécit, mais il y a de plus en plus d'échantillons dont la fréquence est dans K.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			T_{250}	0,968		taille n	1	2
2		$K = [f_1; f_2]$						
3	ech. n°	f_1	f_2	f	f dans K ?	T	simulations	
4	1	0	1	1	1	1,000	1	
5	2	0	1	0	1	1,000	0	0
6	3	0	0,877	1	0	0,667	1	1
7	4	0	0,800	0,25	1	0,750	0	0
8	5	0	0,747	0,2	1	0,800	1	0
9	6	0	0,708	0,5	1	0,833	0	1
10	7	0	0,678	0,1428571	1	0,857	1	0
11	8	0	0,654	0,25	1	0,875	1	0
12	9	0	0,633	0,5555556	1	0,889	1	1
13	10	0	0,616	0,2	1	0,900	0	0
14	11	0	0,602	0,1818182	1	0,909	1	0
15	12	0,011	0,589	0,25	1	0,917	1	0
16	13	0,023	0,577	0,4615385	1	0,923	0	1
17	14	0,033	0,567	0,2142857	1	0,929	1	0
18	15	0,042	0,558	0,4666667	1	0,933	0	0

2°) Vers quoi se rapproche cette fréquence ?

On sélectionne de D4 à D253, et on va dans Insertion
→ Graphiques → Nuage de points.

2°) Vers quoi se rapproche cette fréquence ?

On sélectionne de D4 à D253, et on va dans Insertion
→ Graphiques → Nuage de points.

2°) Vers quoi se rapproche cette fréquence ?

Quelles caractéristiques sont sur les axes ?

2°) Vers quoi se rapproche cette fréquence ?

Quelles caractéristiques sont sur les axes ?

2°) Vers quoi se rapproche cette fréquence ?

Quelles caractéristiques sont sur les axes ?

Que représentent les courbes bleues ?

Que représentent les courbes bleues ?

Les bornes f_1 et f_2 de l'intervalle $K = [f_1; f_2]$.

Peut-on en déduire la **proportion T** ?

ech. n°	f ₁	f ₂	f	f dans K ?	T	simulations	
1	0	1	1	1	1,000	1	0
2	0	1	0	1	1,000	0	0
3	0	0,877	0,6666667	1	1,000	1	0
4	0	0,800	0,25	1	1,000	0	0
5	0	0,747	0,4	1	1,000	0	1
6	0	0,708	0,5	1	1,000	1	1
7	0	0,678	0,4285714	1	1,000	1	0
8	0	0,654	0,25	1	1,000	0	0
9	0	0,633	0,6666667	0	0,889	1	1
10	0	0,616	0,4	1	0,900	0	1
11	0	0,602	0,0909091	1	0,909	0	0
12	0,011	0,589	0,3333333	1	0,917	1	0
13	0,023	0,577	0,3076923	1	0,923	1	1
14	0,033	0,567	0,0714286	1	0,929	0	0
15	0,042	0,558	0,3333333	1	0,933	1	1

échantillon qui n'est pas dans K

ech. n°	f ₁	f ₂	f	f dans K ?	T	simulations	
1	0	1	1	1	1,000	1	0
2	0	1	0	1	1,000	0	0
3	0	0,877	0,6666667	1	1,000	1	0
4	0	0,800	0,25	1	1,000	0	0
5	0	0,747	0,4	1	1,000	0	1
6	0	0,708	0,5	1	1,000	1	1
7	0	0,678	0,4285714	1	1,000	1	0
8	0	0,654	0,25	1	1,000	0	0
9	0	0,633	0,6666667	0	0,889	1	1
10	0	0,616	0,4	1	0,900	0	1
11	0	0,602	0,0909091	1	0,909	0	0
12	0,011	0,589	0,3333333	1	0,917	1	0
13	0,023	0,577	0,3076923	1	0,923	1	1
14	0,033	0,567	0,0714286	1	0,929	0	0
15	0,042	0,558	0,3333333	1	0,933	1	1

échantillon qui n'est pas dans K

ech. n°	f ₁	f ₂	f	f dans K ?	T	simulations	
1	0	1	1	1	1,000	1	0
2	0	1	0	1	1,000	0	0
3	0	0,877	0,6666667	1	1,000	1	0
4	0	0,800	0,25	1	1,000	0	0
5	0	0,747	0,4	1	1,000	0	1
6	0	0,708	0,5	1	1,000	1	1
7	0	0,678	0,4285714	1	1,000	1	0
8	0	0,654	0,25	1	1,000	0	0
9	0	0,633	0,6666667	0	0,889	1	1
10	0	0,616	0,4	1	0,900	0	1
11	0	0,602	0,0909091	1	0,909	0	0
12	0,011	0,589	0,3333333	1	0,917	1	0
13	0,023	0,577	0,3076923	1	0,923	1	1
14	0,033	0,567	0,0714286	1	0,929	0	0
15	0,042	0,558	0,3333333	1	0,933	1	1

échantillon qui n'est pas dans K

ech. n°	f ₁	f ₂	f	f dans K ?	T	simulations	
1	0	1	1	1	1,000	1	
2	0	1	0	1	1,000	0	0
3	0	0,877	0,6666667	1	1,000	1	0
4	0	0,800	0,25	1	1,000	0	0
5	0	0,747	0,4	1	1,000	0	
6	0	0,708	0,5	1	1,000	1	
7	0	0,678	0,4285714	1	1,000	1	0
8	0	0,654	0,25	1	1,000	0	0
9	0	0,633	0,6666667	0	0,889	1	1
10	0	0,616	0,4	1	0,900	0	1
11	0	0,602	0,0909091	1	0,909	0	0
12	0,011	0,589	0,3333333	1	0,917	1	0
13	0,023	0,577	0,3076923	1	0,923	1	1
14	0,033	0,567	0,0714286	1	0,929	0	0
15	0,042	0,558	0,3333333	1	0,933	1	1

Peut-on en déduire la **proportion T** ?

Peut-on en déduire la **proportion T** ?

Peut-on en déduire la **proportion T** ?

$$T = \frac{250 - 9}{250} = 0,964$$

Peut-on en déduire la **proportion T** ?

$$T = \frac{250 - 9}{250} = 0,964$$

Vers quoi se rapproche la fréquence ?

Peut-on en déduire la **proportion T** ?

$$T = \frac{250 - 9}{250} = 0,964$$

Vers quoi se rapproche la fréquence ? de $p = 0,3$

Lorsque la **taille n** tend vers l'infini

il y a **95% d'échantillons** dans l'**intervalle K**

On utilise ce **critère de confiance au seuil de 95%**

pour rejeter (échantillons non représentatifs du phénomène aléatoire, on dit qu'il est non fiable, ou peu probable)

ou garder un **échantillon** :

l'échantillon est fiable

↔ sa fréquence **f** est dans $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

Exercice 6 :

30% des habitants d'une ville portent un chapeau. Un article dans un journal montre une photographie prise au hasard où 23 des 54 personnes portent un chapeau.

La mairie a-t-elle raison de se plaindre de la photographie, qu'elle estime non représentative de sa population ?

Exercice 6 :

30% des habitants d'une ville portent un chapeau. Un article dans un journal montre une photographie prise au hasard où 23 des 54 personnes portent un chapeau.

La mairie a-t-elle raison de se plaindre de la photographie, qu'elle estime non représentative de sa population ?

Le collégien répondrait ...

Un collégien répondrait :

... ?

Un collégien répondrait :

23

$$f = \frac{23}{54} \approx 0,4259... \neq p = 0,3$$

54

$$f \neq p$$

donc l'échantillon n'est pas représentatif.

Mais il a tort car il suppose ...

Un collégien répondrait :

23

$$f = \frac{23}{54} \approx 0,4259... \neq p = 0,3$$

54

$$f \neq p$$

donc l'échantillon n'est pas représentatif.

Mais il a tort car il suppose qu'il y a un phénomène de **proportionnalité**, ce qui est faux car les proportions de chapeaux dans la ville ne sont pas constantes (mélange **hétérogène**).

Mais un lycéen connaît le phénomène
de la **fluctuation d'échantillonnage** :

Il sait que les 30 % ne sont pas

Mais un lycéen connaît le phénomène de la fluctuation d'échantillonnage :

Il sait que les 30 % ne sont pas **équitablement répartis** dans la ville, donc que toutes les photographies n'auront pas la même proportion :

Mais un lycéen connaît le phénomène de la fluctuation d'échantillonnage :

Il sait que les 30 % ne sont pas **équitablement répartis** dans la ville, donc que toutes les photographies n'auront pas la même proportion :

Mais un lycéen connaît le phénomène de la fluctuation d'échantillonnage :

Il sait que les 30 % ne sont pas **équitablement répartis** dans la ville, donc que toutes les photographies n'auront pas la même proportion :

Selon le critère de confiance au seuil de 95%

Les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 54 \quad \text{et} \quad p = 0,3 \quad \Rightarrow \quad K \approx [\dots ; \dots]$$

Selon le critère de confiance au seuil de 95%

Les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 54 \quad \text{et} \quad p = 0,3 \quad \Rightarrow \quad K \approx [0,1639 ; 0,4361]$$

Selon le critère de confiance au seuil de 95%

Les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$n = 54$ et $p = 0,3 \Rightarrow K \approx [0,1639 ; 0,4361]$

Selon le critère de confiance au seuil de 95%

Les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 54 \quad \text{et} \quad p = 0,3 \quad \Rightarrow$$

$$f = \frac{23}{54} \approx 0,4259\dots$$

$$0,1639 < 0,4259 < 0,4361$$

$$K \approx [0,1639 ; 0,4361]$$

Selon le critère de confiance au seuil de 95%

Les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 54 \quad \text{et} \quad p = 0,3 \quad \Rightarrow \quad K \approx [0,1639 ; 0,4361]$$

$$f = \frac{23}{54} \approx 0,4259 \dots$$

$$0,1639 < 0,4259 < 0,4361$$

f est dans l'intervalle de confiance

↔ l'échantillon est représentatif du phénomène aléatoire

↔ la mairie ne peut se plaindre du journal.

Exercice 7 :

2500 enfants naissent annuellement à la maternité de Jossigny. Le directeur veut offrir un cadeau rose aux filles et bleu aux garçons.

- 1°) Quel nombre total de cadeaux doit-il prévoir s'il veut être certain de satisfaire tous les parents ?
- 2°) Eliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.
- 3°) Quel est en % le gain obtenu ? Pour quel % de possibilités enlevées ? Calculez le ratio.

Exercice 7 :

2500 enfants naissent annuellement à la maternité de Jossigny. Le directeur veut offrir un cadeau rose aux filles et bleu aux garçons.

1°) Quel nombre total de cadeaux doit-il prévoir s'il veut être certain de satisfaire tous les parents ?

Exercice 7 :

2500 enfants naissent annuellement à la maternité de Jossigny. Le directeur veut offrir un cadeau rose aux filles et bleu aux garçons.

1°) Quel nombre total de cadeaux doit-il prévoir s'il veut être certain de satisfaire tous les parents ?

Chaque enfant naît avec une probabilité de 50% d'être une fille ou un garçon. Mais chaque naissance étant indépendante des autres, on peut obtenir au maximum 2500 garçons, et aussi 2500 filles.

Exercice 7 :

2500 enfants naissent annuellement à la maternité de Jossigny. Le directeur veut offrir un cadeau rose aux filles et bleu aux garçons.

1°) Quel nombre total de cadeaux doit-il prévoir s'il veut être certain de satisfaire tous les parents ?

Chaque enfant naît avec une probabilité de 50% d'être une fille ou un garçon. Mais chaque naissance étant indépendante des autres, on peut obtenir au maximum 2500 garçons, et aussi 2500 filles.

Le directeur doit donc prévoir

$$2500 + 2500 = \mathbf{5000} \text{ cadeaux}$$

2°) Eliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.

2°) Eliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.

Supposons que l'exemple de la maternité de Jossigny fasse partie des 95% d'échantillons représentatifs du phénomène aléatoire.

L'hypothèse est pertinente car on ne rejette que 5% des échantillons, et ces échantillons sont très peu probables.

2°) Eliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.

Supposons que l'exemple de la maternité de Jossigny fasse partie des **95% d'échantillons représentatifs du phénomène aléatoire**.

L'**hypothèse** est **pertinente** car on ne rejette que 5% des échantillons, et l'étude des **probabilités** (de niveau 1^{ère} ou T^{ale}) montrerait que ces **échantillons** sont **très peu probables**.

Exemples :

$p(2500 \text{ filles}) = 0,5^{2500} \approx 2,7 \times 10^{-753}$ (la calculette n'arrive pas à donner une valeur approchée plus précise et donne 0)

$p(2499 \text{ filles}) = 2500 \times 0,5^{2499} \times 0,5^1 \approx 6,8 \times 10^{-750}$ (idem)

il y a **2500** branches de l'arbre possédant **1** garçon et **2499** filles

etc...

2°) Éliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.

Supposons que l'exemple de la maternité de Jossigny fasse partie des 95% d'échantillons représentatifs du phénomène aléatoire.

L'hypothèse est pertinente car on ne rejette que 5% des échantillons, et ces échantillons sont très peu probables.

2°) Éliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.

Supposons que l'exemple de la maternité de Jossigny fasse partie des 95% d'échantillons représentatifs du phénomène aléatoire.

L'hypothèse est pertinente car on ne rejette que 5% des échantillons, et ces échantillons sont très peu probables.

Selon le critère de confiance au seuil de 95%, les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

2°) Eliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.

Supposons que l'exemple de la maternité de Jossigny fasse partie des 95% d'échantillons représentatifs du phénomène aléatoire.

L'hypothèse est pertinente car on ne rejette que 5% des échantillons, et ces échantillons sont très peu probables.

Selon le critère de confiance au seuil de 95%, les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 2500 \quad \text{et} \quad p = 0,5 \quad \Rightarrow \quad K = [0,48 ; 0,52]$$

2°) Éliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.

Supposons que l'exemple de la maternité de Jossigny fasse partie des 95% d'échantillons représentatifs du phénomène aléatoire.

L'hypothèse est pertinente car on ne rejette que 5% des échantillons, et ces échantillons sont très peu probables.

Selon le critère de confiance au seuil de 95%, les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 2500 \quad \text{et} \quad p = 0,5 \quad \Rightarrow \quad K = [0,48 ; 0,52]$$

Il y aura entre $0,48 \times 2500 = 1200$ et $0,52 \times 2500 = 1300$ filles

2°) Éliminez certaines possibilités en faisant une hypothèse pertinente, et déterminez le nouveau nombre total de cadeaux.

Supposons que l'exemple de la maternité de Jossigny fasse partie des **95% d'échantillons représentatifs du phénomène aléatoire**.

L'**hypothèse** est **pertinente** car on ne rejette que 5% des échantillons, et ces **échantillons** sont **très peu probables**.

Selon **le critère de confiance au seuil de 95%**, les **échantillons fiables** sont ceux dont la **fréquence** est dans **l'intervalle de confiance** :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 2500 \quad \text{et} \quad p = 0,5 \quad \Rightarrow \quad K = [0,48 ; 0,52]$$

Il y aura entre $0,48 \times 2500 = 1200$ et $0,52 \times 2500 = 1300$ filles

Le directeur doit donc prévoir $1300 + 1300 = 2600$ cadeaux

2°)

Selon le critère de confiance au seuil de 95%, les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$n = 2500$ et $p = 0,5$ $\rightarrow$ $K = [0,48 ; 0,52]$

Il y aura entre $0,48 \times 2500 = 1200$ et $0,52 \times 2500 = 1300$ filles

Le directeur doit donc prévoir $1300 + 1300 = 2600$ cadeaux

3°) Quel est en % le gain obtenu ? Pour quel % de possibilités enlevées ? Calculez le ratio.

2°)

Selon le critère de confiance au seuil de 95%, les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 2500 \quad \text{et} \quad p = 0,5 \quad \Rightarrow \quad K = [0,48 ; 0,52]$$

Il y aura entre $0,48 \times 2500 = 1200$ et $0,52 \times 2500 = 1300$ filles

Le directeur doit donc prévoir $1300 + 1300 = 2600$ cadeaux

3°) Quel est en % le gain obtenu ? Pour quel % de possibilités enlevées ? Calculez le ratio.

On a enlevé $\frac{5000 - 2600}{5000} = 48\%$ de largeur d'intervalle

2°)

Selon le critère de confiance au seuil de 95%, les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$n = 2500$ et $p = 0,5$ $\rightarrow$ $K = [0,48 ; 0,52]$

Il y aura entre $0,48 \times 2500 = 1200$ et $0,52 \times 2500 = 1300$ filles

Le directeur doit donc prévoir $1300 + 1300 = 2600$ cadeaux

3°) Quel est en % le gain obtenu ? Pour quel % de possibilités enlevées ? Calculez le ratio.

On a enlevé $\frac{5000 - 2600}{5000} = 48\%$ de largeur d'intervalle
en enlevant 5% de possibilités

2°)

Selon le critère de confiance au seuil de 95%, les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 2500 \quad \text{et} \quad p = 0,5 \quad \Rightarrow \quad K = [0,48 ; 0,52]$$

Il y aura entre $0,48 \times 2500 = 1200$ et $0,52 \times 2500 = 1300$ filles
Le directeur doit donc prévoir $1300 + 1300 = 2600$ cadeaux

3°) Quel est en % le gain obtenu ? Pour quel % de possibilités enlevées ? Calculez le ratio.

On a enlevé $\frac{5000 - 2600}{5000} = 48\%$ de largeur d'intervalle
en enlevant 5% de possibilités

ratio = $\frac{48}{5} \Rightarrow$ On a obtenu ≈ 10 fois plus !

2°)

Selon le critère de confiance au seuil de 95%, les échantillons fiables sont ceux dont la fréquence est dans l'intervalle de confiance :

$$K = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

$$n = 2500 \quad \text{et} \quad p = 0,5 \quad \Rightarrow \quad K = [0,48 ; 0,52]$$

Il y aura entre $0,48 \times 2500 = 1200$ et $0,52 \times 2500 = 1300$ filles
Le directeur doit donc prévoir $1300 + 1300 = 2600$ cadeaux

3°) Quel est en % le gain obtenu ? Pour quel % de possibilités enlevées ? Calculez le ratio.

On a enlevé $\frac{5000 - 2600}{5000} = 48\%$ de largeur d'intervalle
en enlevant 5% de possibilités

ratio = $\frac{48}{5} \Rightarrow$ On a obtenu ≈ 10 fois plus !